

- ⑧ 【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【白-2】 ラクテック 500mL / div 3時間

- day9.10**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ラクテック 500mL / div 3時間
 - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
 - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

- day11**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

制吐剤セット処方⑳

Day8～11 コントミン糖衣錠(12.5mg) 2錠(分2 朝・夕食後)

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・S-1の投与量を変更すること
シスプラチン

Ccr47～60mL/min 75%Dose

Ccr31～45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

S-1

Ccr60～80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40～59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30以下は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
$\sim < 1.25\text{m}^2$	40mg/回	30mg/回	25mg/回
$1.25\text{m}^2 \leq \sim < 1.5\text{m}^2$	50mg/回	40mg/回	30mg/回
$1.5\text{m}^2 \leq \sim$	60mg/回	50mg/回	40mg/回

当院患者治療目的以外は
使用不可

