


中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-28

申請日	2019/6/11	承認日	2019/7/8	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	2019/6/21	承認者	印

PTX+CDDP+BV	病名	子宮頸癌	産婦人科	提出医
対象	手術または放射線療法による根治治療の対象とならないStageIVB、治療抵抗性、進行・再発子宮頸癌			

薬剤商品名 (カタカナ)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	22	25	30							
パクリタキセル	175mg/m ²	div	○														
シスプラチン	50mg/m ²	div	○														
アバスチン(ベバシズマブ)	15mg/kg	div	○														
投与間隔・休薬期間等:			21日=1コース 														

【投与処方例(前投薬など)】※Day1は0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルター使用

※アバスチン投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチンの投与量を変更すること

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

Day1~5は、体重測定を実施。開始時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液50mL+デキサート20mg /div 5分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL /div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液 500mL+パクリタキセル /div 3時間

注意 ②と④は必ず30分以上あけること。

- ⑥ 【白-1】ラクテック 500mL / div 3時間
- ⑦ 【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

day2

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg / div 30分
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL /div 5分
- ⑤ メイン【赤-4】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑥ メイン【赤-5】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑦ メイン【赤-6】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑧ メイン【白-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ⑨ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑩ メイン【白-2】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可)

day3.4.5

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ラクテック 500mL / div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的

Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day2~5 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day2~5 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

当院患者治療目的以外は
使用不可