

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-34N

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

PTX+CBDCA	病名	卵管癌	産婦人科	提出医
<b>対象</b>	卵管癌の術前化学療法 (Neoadjuvant)			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div, iv, po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	22	25	30							
パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	div	○														
カルボプラチン	AUC×6	div	○														
投与間隔・休薬期間等:			21日=1コース 3~6コース行う														

【投与処方例(前投薬など)】

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

※0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを使用

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキササート20mg / div 30分
- ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL / div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液500mL+パクリタキセル /div 3時間
- ⑥ メイン【白】生理食塩液 250mL+カルボプラチン /div 1時間

制吐剤セット処方⑨

Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)

Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

Day1~4 プリンペラン5mg 3錠(分3 毎食後)

当院患者治療目的以外は  
使用不可