

- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート9.9mg/ div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL + イリノテカン /div 1.5時間
- ④ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑤ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑥ メイン【白-3】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑦ メイン【黄-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ⑧ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【黄-2】ラクテック500mL / div 3時間

day2.3.4

- ① 生理食塩水100mL+デキサート6.6mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ラクテック 500mL / div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

day8.15

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4.95mg/ div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+イリノテカン /div 1.5時間

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1~4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1~4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可