

中津市民病院化学療法プロトコール  
【レジメンNo】H-10

|                         |      |     |   |
|-------------------------|------|-----|---|
| 申請日                     | 承認日  | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 (見直し 2020/3/16) | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| FCM 療法                |                              | 病名                   | 悪性リンパ腫             | 血液内科 | 医師名 |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------|-----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| <b>対象</b>             |                              | 悪性リンパ腫               |                    |      |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 薬剤商品名<br>(一般名)        | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等) | 投与方法<br>(div,iv,po等) | 投与スケジュール(日)        |      |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|                       |                              |                      | 1                  | 5    | 10  | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| エンドキサン<br>(シクロホスファミド) | 200mg/m <sup>2</sup>         | div                  | ○                  | ○    | ○   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| ノバントロン<br>(ミトキサントロン)  | 8mg/m <sup>2</sup>           | div                  | ○                  |      |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| フルダラ(フルダラビン)          | 40mg/m <sup>2</sup>          | po.                  | ○                  | ○    | ○   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 投与間隔・休薬期間等:           |                              |                      | 28日=1コース<br>4コースまで |      |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

【投与処方例(前投薬など)】

**day1**

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+アロキン IV+デキサート12mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液500mL+エンドキサン /div 4時間
- ④ メイン【白】 生理食塩液100mL+ノバントロン /div 30分

**day2,3**

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液500mL+エンドキサン /div 4時間

※フルダラビン投与量

| 体表面積(m <sup>2</sup> ) | 1日用量     |
|-----------------------|----------|
| 0.89-1.13             | 40mg(4錠) |
| 1.14-1.38             | 50mg(5錠) |
| 1.39-1.63             | 60mg(6錠) |
| 1.64-1.88             | 70mg(7錠) |
| 1.89-2.13             | 80mg(8錠) |
| 2.14-2.38             | 90mg(9錠) |

※減量規定あり