


中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-17

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

R-CHOP 療法	病名	非ホジキンリンパ腫	血液内科	医師名
対象	CD20陽性の非ホジキンリンパ腫			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)									
			1	5	10	15	20	25	30			
リツキシマブ	375mg/m ²	div	○									
ドキシソルビシン	50mg/m ²	iv	○									
エンドキサン (シクロホスファミド)	750mg/m ²	div	○									
オンコビン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ² (max2.0mg)	iv	○									
プレドニゾロン錠	100mg/body	div or po.	○	○	○	○						

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 

【投与処方例(前投薬など)】

day1

レスタミンコーワ錠(10)4錠 } /po.リツキシマブ投与30分前
 カロナール(200)2錠 }

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メドロール125mg /div 30分
- ③ メイン【赤】生理食塩液500mL+リツキシマブ /div (1mg/mLになるよう薬剤科で調製)

day2

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+水溶性プレドニン10A /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL / 5分
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL+ドキシソルビシン /div 5分
- ⑤ 【コネクタ1】生理食塩液20mL+オンコピン /iv (ゆっくり)
- ⑥ メイン【白】生理食塩液500mL+エンドキサン /div 2時間

※リツキシマブの速度

初回 最初の1時間(25mg/hr)次の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)
2回目以降 初回副作用軽微な場合は、 最初の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)