

中津市民病院化学療法プロトコール

【レジメンNo】H-20

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 (見直し 2020/3/16)	仮承認日	承認者	印

アドセトリス単独 療法	病名	ホジキンリンパ腫 末梢性T細胞リンパ腫	血液内 科	医師名					
<b>対象</b>	再発または難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫及び末梢性T細胞リンパ腫								
薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)						
アドセトリス (ブレンツキシマブ ベドチン)	1.8mg/kg	div	1	5	10	15	20	25	30
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 最高16コース									

【投与処方例(前投薬など、**フィルター不可**)

レスタミンコーワ錠(10)4錠  
カロナール(200)2錠 } /po.アドセトリス投与30分前

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ Y側管【水色】アドセトリス+生理食塩液100mL/div 30分(希釈後の濃度は0.4~1.2mg/mLとなるように調製)  
(10.5mL/Vの注射用水で溶解し、その後希釈を行う)