

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-49

申請日	2022/3/4	承認日	2022/3/14	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

Pola+R-Benda	療法	病名	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	血液内 科	医師名										
対象 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫															
薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)												
			1	5	10	15	20	22	25	30					
リツキシマブ	375mg/m ²	div	○							○					
ポライビー(ポラツズマブ ベドチン)	1.8mg/kg	div	○							○					
ベンダムスチン	90mg/m ²	div	○	○							○	○			
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 6コースまで			← 1コース						2コース →						

【投与処方例(前投薬など)】

*ポライビーは40Kg未満では生理食塩水50mLに溶解を行う

- | | |
|--|--|
| <p>初回</p> <p>day1 レスタミンコーワ錠(10)4錠
カロナール(200)2錠 } /po.リツキシマブ投与30分前</p> <p>① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メドロール125mg /div 30分
③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+リツキシマブ /div
(1mg/mlになるよう薬剤科で調整)</p> <p>day2 レスタミンコーワ錠(10)4錠
カロナール(200)2錠 } /po.ポライビー投与30分前</p> <p>① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メルコート125mg /div 30分</p> | <p>2回目以降 day1 レスタミンコーワ錠(10)4錠
カロナール(200)2錠 } /po.リツキシマブ投与30分前</p> <p>① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メルコート125mg /div 30分
③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+リツキシマブ /div
(1mg/mlになるよう薬剤科で調整)</p> <p>④ メイン【白-1】生理食塩水100mL/div 30分
⑤ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+ポライビー /div (2回目以降30分可)</p> <p>day2</p> <p>① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div</p> |
|--|--|

- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+ポライビー /div (初回1.5時間)
- ④ メイン【白-1】生理食塩液100mL+アロカス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg/div 30分
- ⑤ メイン【白-2】生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分
(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

day3

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分
(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg/div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分
(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

day3

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分
(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

※リツキシマブの速度

<p>初回 最初の1時間(25mg/hr)次の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)</p> <p>2回目以降 初回副作用軽微な場合は、 最初の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)</p>

【参考文献】ポライビー点滴静注用適正使用ガイド、国内臨床試験、JO40762試験(P-DRIVE試験)