

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-51

|         |           |      |           |     |   |
|---------|-----------|------|-----------|-----|---|
| 申請日     | 2023/5/8  | 承認日  | 2023/6/12 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 | 2023/10/1 | 仮承認日 |           | 承認者 | 印 |

| GB(1コース目) 療法                                  | 病名                           | 濾胞性リンパ腫              | 血液内 科       | 医師名 | Dr |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|----------------------|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| <b>対象</b>                                     | CD20陽性の濾胞性リンパ腫               |                      |             |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 薬剤商品名<br>(一般名)                                | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等) | 投与方法<br>(div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|   |                              |                      | 1           | 5   | 8  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| ガザイバ(オビヌツズマブ)                                 | 1000mg/Body                  | div                  | ○           |     | ○  |    |    | ○  |    |    |  |  |  |  |  |  |
| ベンダムスチン                                       | 90mg/m <sup>2</sup>          | div                  | ○           | ○   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース                          |                              |                      |             |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 本コースは1コースのみ。終了後、【H-52】のレジメンに移行し、Total 6コースまで。 |                              |                      |             |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

## 【投与処方例(前投薬など)】

**day1.8.15** レスタミンコーワ錠(10)4錠  
 カロナール(200)2錠 } /po.ガザイバ投与30分前

### day1

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+ソル・メドロール80mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL/div 1時間
- ④ メイン【赤-3】 生理食塩液210mL+ガザイバ /div (全量250mLになるよう薬剤科で調製)
- ⑤ メイン【白-1】 生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg/div 30分
- ⑥ メイン【白-2】 生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

### day2

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】 生理食塩液50mL+ベンダムスチン /div 10分(終了後メインの生理食塩液でウォッシュアウト)

## day8.15

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メドロール80mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL/div 1時間
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液210mL+ガザイバ /div (全量250mLになるよう薬剤科で調製)

終了後、メインの生理食塩液をゆっくりと流す

### ※ガザイバの速度

**初回** 12mL/hrで30分点滴→25mL/hrで30分点滴→37mL/hrで30分点滴→50mL/hrで30分点滴

→62mL/hrで30分点滴→75mL/hrで30分点滴→87mL/hrで30分点滴→100mL/hrで投与 順調にいけばTotal 4時間15分かかる

**2回目以降** 初回副作用軽微な場合は、

25mL/hrで30分点滴→50mL/hrで30分点滴→75mL/hrで30分点滴→100mL/hrでその後投与 順調にいけばTotal 3時間15分かかる

Day1noベンダムスチンは薬剤科にとりにきたのち、冷所に保管。使用する1時間前に室温に戻す。

【参考文献】ガザイバ点滴静注用適正使用ガイド、GALLIUM試験