

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-53

申請日	2023/5/8	承認日	2023/6/12	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

Obinutuzumab(維持) 療法	病名	濾胞性リンパ腫	血液内 科	医師名	Dr
対象	CD20陽性の濾胞性リンパ腫				
薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)		
ガザイバ(オビヌツズマブ)	1000mg/Body	div	1		2ヶ月
投与間隔・休薬期間等: 2ヶ月=1コース					
【H-52】からの引き継ぎ 最長で2年間(12コース投与)					
← 1コース →					

【投与処方例(前投薬など)】

day1 レストランコウ錠(10)4錠
カロナール(200)2錠 } /po.ガザイバ投与30分前

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メドロール80mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL/div 1時間
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液210mL+ガザイバ /div (全量250mLになるよう薬剤科で調製)

終了後、メインの生理食塩液をゆっくりと流す

※ガザイバの速度

初回 12mL/hrで30分点滴→25mL/hrで30分点滴→37mL/hrで30分点滴→50mL/hrで30分点滴

→62mL/hrで30分点滴→75mL/hrで30分点滴→87mL/hrで30分点滴→100mL/hrで投与 順調にいけばTotal 4時間15分かかる

2回目以降 初回副作用軽微な場合は、

25mL/hrで30分点滴→50mL/hrで30分点滴→75mL/hrで30分点滴→100mL/hrでその後投与 順調にいけばTotal 3時間15分かかる

【参考文献】ガザイバ点滴静注用適正使用ガイド、GALLIUM試験