

初回 最初の1時間(25mg/hr) 次の1時間(100mg/hr) その後は(200mg/hr)
2回目以降 初回副作用軽微な場合は、最初の1時間(100mg/hr) その後は(200mg/hr)

Day2

レスタミンコーワ錠10mg 4錠
カロナール200mg 2錠 } /po.ポライビー投与30分前

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL＋ソル・メルドロール125mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL＋注射用水(溶解用)＋ポライビー /div (初回1.5時間、2回目以降30分)
- ④ メイン【白-1】 生理食塩液100mL / 30分
- ⑤ メイン【白-2】 生理食塩液100mL＋アロカリス1V＋パロノセトロン1V＋水溶性プレドニン10A /div 30分
- ⑥ メイン【白-3】 生理食塩液50mL / 5分
- ⑦ メイン【白-4】 生理食塩液50mL＋ドキシソルビン /div 5分
- ⑧ メイン【黄】 生理食塩液500mL＋エンドキサン /div 2時間

制吐剤セット処方①Infusion reactin予防

リツキシマブ、ポライビー投与30分前

レスタミンコーワ錠10mg 4錠

カロナール200mg 2錠

【肝機能障害による減量基準】

※エンドキサン T-bil 3～5mg/dLまたはAST>180U/L : 75%Dose

T-bil≥5mg/dL 投与不可

※ドキシソルビン T-bil 1.5～3mg/dLもしくはAST60～180U/L : 50%Dose

T-bil 3.1～5mg/dLもしくはAST>180U/L : 25%Dose

T-bil≥5mg/dL 投与不可

【腎機能障害による減量基準】

※エンドキサン CCr10～50mL/min : 75%Dose
 CCr<10mL/min : 50%Dose

【副作用による減量基準】

※ポライビー

末梢性ニューロパチー

感覚性G2: 1.4mg/kgに減量する。次回投与までに持続する場合は1mg/kgに減量。減量しても続く場合は中止。

感覚性G3: G2以下になるまで中止。回復後は1.4mg/kgに減量する。

すでに1.4mg/kgに場合は1mg/kgに減量。すでに1mg/kgの場合は中止。

運動性G2: G1以下になるまで中止。回復後は1.4mg/kgに減量する。

すでに1.4mg/kgに場合は1mg/kgに減量。すでに1mg/kgの場合は中止。

運動性G3: G1以下になるまで中止。回復後は1.4mg/kgに減量する。

すでに1.4mg/kgに場合は1mg/kgに減量。すでに1mg/kgの場合は中止。

【注意すること】

※ドキソルビシンは累積投与量500mg/m²を超えないことを確認すること

※感染症予防のために、ST合剤と抗真菌薬の内服を開始すること

※ポライビーは40Kg未満では生理食塩液50mLに溶解を行う