中津市民病院化学療法レジメン 【レジメンNo】H-62

申請日	2024/2/19	承認日 2	2024/3/11	委員長	印
レジメン 登録日	2024/3/11	仮承認日		承認者	印

Rituximab維持			病名	びまん性大細胞	包型B細胞リンパ	腫血液		科	医師名		Dr		
対象	対象 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫で【H-61】からの移行												
		!	!										
薬剤商品名		投与量	投与方法	投与スケジュール(日)									
(一般名)		(mg/m²等)	div. iv. po等 1	5	10	15		20		25	30		
リツキシマブ		375mg/m²	div C										
投与間隔・休薬期間等:21日=1コース ◆													
【H-61】からの移行 1コ-ス													
最大2コースまで													

【投与処方例(前投薬など)】

レスタミンコーワ錠10mg 4錠 カロナール200mg 2錠

/po.リツキシマブ投与30分前

- ① メインキープ [緑] 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+ソル・メドロール125mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液500mL+リツキシマブ /div (1mg/mLになるよう薬剤科で調製)

※リツキシマブの速度

初回 最初の1時間(25mg/hr)次の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)

2回目以降 初回副作用軽微な場合は、最初の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)

制吐剤セット処方⑪Infusion reactin予防

リツキシマブ投与30分前

レスタミンコーワ錠10mg 4錠

カロナール200mg 2錠

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会 <無断転用禁止>