

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-65

申請日	2024/4/8	承認日	2024/4/8	委員長	印
レジメン登録日	2024/7/10	仮承認日		承認者	印

Dra(sc)Bd 9コース目以降	病名	多発性骨髄腫	血液内 科	医師名	Dr
対象	前治療歴を有する再発又は難治性の多発性骨髄腫				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 div. iv. po等	投与スケジュール (日)											
			1	4	5	8	10	11	15	20	25	30		
ダラキューロ (ダラツムマブ・ ボルヒアルロニダーゼアルファ)	1800mg/Body	sc	○											
デカドロン錠 (デキサメタゾン)	20mg/Body	po	○											
投与間隔・休薬期間等：28日＝1コース														
【H-64】からの移行患者														
1コース														

【投与処方例 (前投薬など)】

Day1

レスタミンコーワ錠10mg 4錠
カロナール500mg 2錠
デカドロン錠4mg 5錠

/po.ダラキューロ投与60分前

① ダラキューロ /皮下注 5分(腹壁部周囲の推奨範囲に)

【検査等確認事項】

心肺に及ぼす影響 本レジメン開始前に心エコー・心電図検査と間質性肺炎、肺線維症などの精査のために
肺に及ぼす影響 間質性肺炎、肺線維症などの精査のためにCT検査を実施
輸血に及ぼす影響 治療開始前に不規則抗体スクリーニング検査を含めた一般的な輸血前検査を実施すること。

不規則抗体を持たない患者でも偽陽性になることがあり、本剤治療中及び最終投与から6ヶ月後まで続く可能性がある。

【注意すること】

ダラキューロは臍から左右に約7.5cmの腹部皮下に、ダラキューロ約15mLを5分かけて投与を行う。
感染症への対策として、帯状疱疹の予防で抗ウイルス薬・PCP予防でST合剤の内服を行う

当院患者治療目的以外は
使用不可202520