

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-07

申請日	2023/8/14	承認日	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	承認者	印

A+AVD 療法	病名	ホジキンリンパ腫	血液内科	医師名
対象 CD30陽性のホジキンリンパ腫				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	25	30								
アドセトリス (ブレンツキシマブ ベドチン)	1.2mg/kg	div	○				○										
ドキシソルビシン	25mg/m ²	div	○				○										
エクザール (ビンブラスチン)	6mg/m ² (max10mg)	iv	○				○										
ダカルバジン	375mg/m ²	div	○				○										

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース ← 6コースまで → 1コース

【投与処方例(前投薬など)】

※ダカルバジンは輸液ボトル、ルートともに遮光する

アドセトリスはフィルター使用不可

(添付文書に記載がないが、メーカーDIセンターより治験段階でフィルターを使用してのデータがないので不可と確認) 2023.8.30

レスタミンコーワ錠(10)4錠
 カロナール(200)2錠 } /po.アドセトリス投与30分前

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg/div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL / 5分
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL+ドキシソルビシン /div 5分
- ⑤ 【コネクタ1】生理食塩液20mL+エクザール /iv 1~5分

- ⑥ Y側管【水色】生理食塩液100mL+注射用水(溶解用)+アドセトリス /div 30分(希釈後の濃度は0.4~1.2mg/mLとなるように調製)
(10.5mL/Vの注射用水で溶解し、その後希釈を行う)
- ⑦ メイン【白】5%ブドウ糖液100mL+ダカルバジン /div 30分

制吐剤セット処方③

day2~4 デカドロン(4) 2錠 1×朝食後

当院患者治療目的以外は
使用不可