

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-9

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

DA-EPOCH-R 療法	病名	非ホジキンリンパ腫 (B細胞性)	血液内科	医師名
<b>対象</b>	再発または難治性の非ホジキンリンパ腫(B細胞性)			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div, iv, po等)	投与スケジュール(日)										
			1	5	10	15	20	25	30				
リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	div	○										
エトポシド	50mg/m <sup>2</sup> /day	div	○	○	○	○							
ドキシソルビシン	10mg/m <sup>2</sup> /day	div	○	○	○	○							
オンコビン(ビンクリスチン)	0.4mg/m <sup>2</sup> /day	div	○	○	○	○							
エンドキサン(シクロホスファミド)	750mg/m <sup>2</sup>	div				○							
プレドニゾン	60mg/m <sup>2</sup> /day	div or po	○	○	○	○	○						

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース  
 6~8コース  
 ※オンコビンは、最大2mg(1コースあたり) ※ST合剤、PPI内服を併用する

【投与処方例(前投薬など)】

day1

レスタミンコーワ錠(10)4錠 } /po.リツキシマブ投与30分前  
 カロナール(200)2錠 }

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メルコート125mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+リツキシマブ /div (1mg/mLになるよう薬剤科で調整)
- ④ メイン【白-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V /div 30分
- ⑤ メイン【白-2】生理食塩液50mL /div 5分
- ⑥ Y側管【水色】生理食塩液500mL+エトポシド+ドキシソルビシン+オンコビン /div 24時間

day2~4

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ②       メイン【赤】生理食塩液100mL+グラニセトロン1A /div 30分
- ③       Y側管【水色】生理食塩液500mL+エトポシド+ドキソルビシン+オンコビン /div 24時間

### day5

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ②       メイン【赤-1】生理食塩液100mL+グラニセトロン1A /div 30分
- ③       メイン【赤-2】生理食塩液100mL+エンドキサン /div 30分

### ※リツキシマブの速度

**初回** 最初の1時間(25mg/hr)次の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)  
**2回目以降** 初回副作用軽微な場合は、  
 最初の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)

### \*DA (dose-adjusted)-EPOCH-R療法の投与量設定方法\*

DA-EPOCH-R療法の開始時投与量を基準にして、コース毎に投与量を下記の基準で設定する

1. 骨髄抑制によるANC (好中球絶対数) のnadirで血液毒性を有する薬剤: エトポシド、ドキソルビシン、エンドキサンの用量を増減する
  - a. 投与量の増量は、エトポシド、ドキソルビシン、エンドキサンの3剤で行う
  - b. 投与量の減量は、エンドキサンのみで行う
  - c. ANCは3日ごと週2回の血算で評価する
  - d. 投与量の設定
    - ・nadirのANCが全ての測定で $\geq 500/\mu\text{l}$  →直前のコースの20%増量して次のコースへ
    - ・nadirのANCが測定中1, 2度で $< 500/\mu\text{l}$  →直前のコースと同量で次のコースへ
    - ・nadirのANCが測定中3度以上が $< 500/\mu\text{l}$  →エンドキサンを20%減量して次のコースへ
2. 骨髄抑制による血小板減少が、nadirで $< 25,000/\mu\text{l}$ のとき :  
       nadirのANCにかかわらずエンドキサンを直前コースの20%減量して次のコースへ
3. オンコビンによる神経毒性出現時は:
  - ・運動神経障害grade2 →オンコビンを直前コースの25%減量、grade3→オンコビンを直前コースの50%減量
  - ・感覚神経障害grade3 →オンコビンを直前コースの50%減量