

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-19

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

wPTX+Trastuzumab	病名	乳癌	外科	提出医	Dr
<b>対象</b>	HER2陽性の術後、進行または再発乳癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)											
			1	5	10	15	20	25	30					
ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回4mg/kg	div	○											
	2回目以降 2mg/kg				○		○		○		○			
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	div	○		○		○		○		○			

投与間隔・休薬期間等: 7日=1コース  
術後は最大12コース

【投与処方例(前投薬など)】 ※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

ジクロフェナク坐剤(12.5~50mg)挿肛(ハーセプチン初回量時)

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】 生理食塩液250mL+注射用水+ハーセプチン /div(初回量90分、2回目以降量30分)  
注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解
- ③ メイン【白-1】 生理食塩液50mL+デキサート8mg /div 5分

- ④ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ⑤ メイン【白-2】生理食塩水100mL /div 30分
- ⑥ メイン【白-3】5%ブドウ糖液250mL+パクリタキセル /div 1時間

注意 ③と⑤は必ず30分以上あけること。

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的  
Day1 レスタミンコーワ錠(10) 5錠(治療の30分前)

当院患者治療目的以外は  
使用不可