

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-31

|         |           |      |           |     |   |
|---------|-----------|------|-----------|-----|---|
| 申請日     | 2019/4/17 | 承認日  | 2019/5/13 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 | 2023/10/1 | 仮承認日 | 2019/5/13 | 承認者 | 印 |

|                     |                  |    |    |     |     |
|---------------------|------------------|----|----|-----|-----|
| Eribulin+Per+Tra 療法 | 病名               | 乳癌 | 外科 | 提出医 | Dr. |
| <b>対象</b>           | HER2陽性の進行または再発乳癌 |    |    |     |     |

| 薬剤商品名<br>(一般名)       | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等) | 投与方法<br>(div,iv,po等) | 投与スケジュール(日) |   |    |    |    |    |         |    |   |  |  |  |   |
|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|----|----|----|----|---------|----|---|--|--|--|---|
|                      |                              |                      | 1           | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25      | 30 |   |  |  |  |   |
| ハラヴェン(エリブリン)         | 1.4mg/m <sup>2</sup>         | div                  | ○           |   | ○  |    |    |    |         |    | ○ |  |  |  | ○ |
| パージェタ<br>(ペルツズマブ)    | 初回840mg/body                 | div                  | ○           |   |    |    |    |    |         |    |   |  |  |  |   |
|                      | 2回目以降<br>420mg/body          | div                  |             |   |    |    |    |    |         | ○  |   |  |  |  |   |
| ハーセプチン<br>(トラスツズマブ)  | 初回8mg/kg                     | div                  | ○           |   |    |    |    |    |         |    |   |  |  |  |   |
|                      | 2回目以降<br>6mg/kg              | div                  |             |   |    |    |    |    |         | ○  |   |  |  |  |   |
| 投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース |                              |                      | ← 1コース目     |   |    |    |    |    | ← 2コース目 |    |   |  |  |  |   |

【投与処方例(前投薬など)】

**day1** ジクロフェナクNa坐剤12.5~50mg挿肛(パージェタ、ハーセプチン両方もしくはいずれかが初回量の時)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+ハラヴェン / div 5分

- ④ メイン【白】生理食塩水250mL+パージェタ /div (初回量(840mg/body) 60分、2回目以降量(420mg/body) 30分)
- ⑤ メイン【黄-1】生理食塩水100mL /div (パージェタ初回量時60分、2回目以降量時30分)
- ⑥ メイン【黄-2】生理食塩水250mL+注射用水+ハーセプチン /div (初回量(8mg/kg) 90分、2回目以降量(6mg/kg) 30分)  
注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解  
ハーセプチン投与終了後30分はメインルートキープにつないで様子を見ること。

### day8

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+ハラヴェン /div 5分

\* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて投与量を変更すること

### ※ハラヴェン

Ccr15~50mL/min 1.1mg/m<sup>2</sup>

Ccr15以下は推奨がない。