

化学療法プロトコール

【レジメンNo】M-32

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日	(見直し) 2020/4/24)	仮承認日	承認者 印

PTX+Per+Tra 療法	病名 乳癌	外科	提出医
対象	HER2陽性の進行または再発乳癌		

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)											
			1	5	10	15	20	22	25	30				
パージェタ (ペルツズマブ)	初回840mg/body	div	○											
	2回目以降 420mg/body	div							○					
ハーセプチン (トラスツズマブ)	初回 8mg/kg	div	○											
	2回目以降 6mg/kg	div							○					
パクリタキセル	80mg/m ²	div	○		○		○		○		○		○	

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

1コース
2コース

【投与処方例(前投薬など)】※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

Day1 シクロフェナクNa坐剤12.5~50mg挿肛(パージェタ、ハーセプチン両方もしくはいずれかが初回量の時)

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液250mL + パージェタ /div (初回量(840mg/body)60分、2回目以降量(420mg/body)30分)

- ③ メイン【白-1】 生理食塩液100mL /div (パーゼタ初回量時60分、2回目以降量時30分)
- ④ メイン【白-2】 生理食塩液250mL + ハーセプチン /div (初回量(8mg/kg)90分、2回目以降量(6mg/kg)30分)
- ⑤ メイン【黄-1】 生理食塩液50mL + デキサート8mg /div 5分
- ⑥ 【コネクタ1】 ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ⑦ メイン【黄-2】 生理食塩水100mL /div 30分
- ⑧ メイン【黄-3】 5%ブドウ糖液250mL + パクリタキセル /div 1時間

注意 ⑤と⑦は必ず30分以上あけること。

Day8.15

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液50mL + デキサート8mg /div 5分
- ③ 【コネクタ1】 ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】 生理食塩水100mL /div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】 5%ブドウ糖液250mL + パクリタキセル /div 1時間

注意 ②と④は必ず30分以上あけること。

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的

Day1、8、15 レスタミンコーワ錠(10) 5錠(治療の30分前)