

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】M-33

|         |           |      |           |     |   |
|---------|-----------|------|-----------|-----|---|
| 申請日     | 2019/7/29 | 承認日  | 2019/8/19 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 | 2023/10/1 | 仮承認日 | 2019/8/19 | 承認者 | 印 |

|                 |                                |    |    |     |     |
|-----------------|--------------------------------|----|----|-----|-----|
| Neo Per+Tra+DTX | 病名                             | 乳癌 | 外科 | 提出医 | Dr. |
| <b>対象</b>       | HER2陽性乳癌 術前(Neoadjuvant)補助化学療法 |    |    |     |     |

| 薬剤商品名<br>(一般名)      | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等) | 投与方法<br>(div, iv, po等) | 投与スケジュール(日) |   |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|--|--|
|                     |                              |                        | 1           | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 |  |  |
| パージェタ<br>(ペルツズマブ)   | 初回840mg/Body                 | div                    | ○           |   |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                     | 2回目以降<br>420mg/Body          | div                    |             |   |    |    |    |    | ○  |    |  |  |
| ハーセプチン<br>(トラスツズマブ) | 初回8mg/kg                     | div                    | ○           |   |    |    |    |    |    |    |  |  |
|                     | 2回目以降<br>6mg/kg              | div                    |             |   |    |    |    |    | ○  |    |  |  |
| ドセタキセル              | 75mg/m <sup>2</sup>          | div                    | ○           |   |    |    |    |    | ○  |    |  |  |

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース  
最大4コースまで

←————— 1コース目 —————→ ←————— 2コース目 —————→

【投与処方例(前投薬など)】※ドセタキセル投与中は、手足をクーリングする

Day1 シクロフェナクNa坐剤12.5~50mg挿肛(パージェタ、ハーセプチン両方もしくはいずれかが初回量の時)

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】 生理食塩液250mL+パージェタ /div  
(初回量(840mg/body)60分、2回目以降量(420mg/body)30分)
- ③ メイン【白-1】 生理食塩液100mL /div (パージェタ初回量時60分、2回目以降量時30分)

- ④ メイン【白-2】生理食塩液250mL+注射用水+ハーセプチン /div (初回量(8mg/kg)90分、2回目以降量(6mg/kg)30分)  
注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解
- ⑤ メイン【黄-1】生理食塩液100mLデキサート8mg /div 30分
- ⑥ メイン【黄-2】5%ブドウ糖液250mL+ドセタキセル /div 1時間

制吐剤セット処方⑦:むくみ抑え目的

Day2.3 デカドロン0.5mg 4錠(分1 朝食後)