

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】 M-42

申請日	2024/7/16	承認日	委員長	印	
レジメン登録	2024/8/2	仮承認日	202/7/29	承認者	印

T-DXd(Trastuzumab Deruxtecan)	病名	乳癌	外科	医師名	Dr
<b>対象</b>	化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能または再発乳癌/化学療法歴のあるHER2低発現の手術不能または再発乳癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 div. iv. po等	投与スケジュール (日)																	
			1	5	10	15	20	25	30											
エンハーツ(トラスツズマブ デルクステカン)	5.4mg/kg	div	○																	
投与間隔・休薬期間等：21日=1コース			←————— 1コース —————→																	

## 【投与処方例 (前投薬など)】

- ※間質性肺疾患対応フローチャートに沿って、ILD疑い時より対応をすること。
- ※開始前にはCT、レントゲン、血液検査(KL-6を含む)、心エコー、心電図を施行すること。
- ※エンハーツ調製時と調製済みのボトルは遮光し、投与を行う。
- ※エンハーツは調製後4時間以内に投与を終了すること。
- ※インラインフィルターを使用する。

- ① メインキープ【緑】 5%ブドウ糖液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 5%ブドウ糖液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート3.3mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 5%ブドウ糖液100mL+注射用水+エンハーツ /div 初回90分、2回目以降30分  
エンハーツ1Vを注射用水5mLで溶解し、使用。

終了後、メインの5%ブドウ糖液を流してフラッシュをすること。

### 【副作用による減量基準】

通常投与量：5.4mg/kg

1段階減量：4.4mg/kg

2段階減量：3.2mg/kg

3段階減量(中止)：3.2mg/kgで忍容性が得られない場合には投与を中止する

#### 制吐剤セット処方④

Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

参考文献：J.Cortes et al. N ENGL J MED 2022; 386: 1143-54.

エンハーツ適正使用ガイド