

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】NEP-02

申請日	2023/1/4	承認日	委員長	印	
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	2023/1/12	承認者	印

Rituximab(多発性血管肉芽腫症)	病名	多発血管性肉芽腫症	腎臓内 科	医師名	Dr
対象	多発血管性肉芽腫症の初発例を含む疾患活動性が高い患者、既存治療で十分な効果が得られない患者				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)												
			1	5	10	15	20	25	30						
リツキサン(リツキシマブ)	375mg/m ² (最大500mg/回)	div	○		○		○		○		○		○		○
投与間隔・休薬期間等:			1週間間隔で4回点滴 その後、半年間休薬												

【投与処方例(前投薬など)】

*リツキサン投与30分前に内服

カロナール錠200mg 1回2錠 と レスタミンコーワ錠10mg 4錠

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+ソル・メドロール125mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+リツキサン /div (1mg/mLになるよう薬剤科で調製)

リツキサンの最大投与量は500mg/回/Bodyです！

※リツキサンの速度

初回 最初の1時間(25mg/hr)次の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)

2回目以降 初回副作用軽微な場合は、

最初の1時間(100mg/hr)その後は(200mg/hr)