

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】NS-02

申請日	2019/10/21	承認日	2014/7/29	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

TMZ+Bev維持	病名	悪性神経膠腫	脳神経外科	医師名	Dr
対象	初発悪性神経膠腫を対象にテモゾロミド併用放射線療法施行後の患者				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div,iv,po 等)	投与スケジュール(日)												
			1	5	10	15	20	25	30						
アバスチン(ベバシズマブ)	10mg/kg	div	○				○					○			
テモダール(テモゾロミド)	※	po.	○	○	○	○	○						○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース
12コースまで

テモダールは(Day1~5服用、その後23日間休薬)、アバスチンは2週間毎に投与

1コース

【投与処方例(前投薬など)】治療期間中は、定期的にタンパク尿/血圧/血液検査を行ってください。

<テモダール>day1~5投与

- 18時夕食後絶食→21時制吐剤(ナゼアOD錠0.1mg 1錠)内服→22時テモダール内服
- 12時30分より絶飲食禁止→15時30分制吐剤(ナゼアOD錠0.1mg 1錠)内服→16時テモダール内服→内服後2時間飲食禁止

※テモダール投与量

150mg/m²で1クール行い、2クール目以降は200mg/m²まで増量可能

<アバスチン>day1.15

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】 生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)