

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C16

申請日	2015/2/16	承認日	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日	承認者	印

SOX (Adjuvant)	病名	大腸癌	外科	提出医
----------------	----	-----	----	-----

対象 R0切除が行われたStageⅢ大腸癌もしくは再発リスクの高いStageⅡの大腸癌(I.C必須)

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																
			1	5	8	10	15	20	22	25	...	35							
オキサリプラチン	130mg/m ²	div	○																
S-1	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
S-1	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース
6ヶ月(計8コース)

【投与処方例(前投薬など)】

*オキサリプラチン投与中は温罨法を行う。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】5%ブドウ糖液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4.95mg/div 30分
- ③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液500mL+オキサリプラチン+デキサート4mg/div 2時間

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、S-1の投与量を変更すること
Ccr60~80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量
Ccr40~59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30以下は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.25m ²	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m ² ≦～<1.5m ²	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m ² ≦～	60mg/回	50mg/回	40mg/回

参考文献

KSCC1303試験