

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C17

申請日	2016/8/9	承認日	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日	承認者	印

SOX+Bevacizumab	病名	大腸癌	外科	提出医
<b>対象</b>	切除不能・進行再発大腸癌			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)											
			1	5	10	15	20	25	28	30				
アバスチン(ベバシズマブ)	7.5mg/kg	div	○											
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	div	○											
S-1	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
S-1	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

- \*アバスチン投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。
- \*オキサリプラチン投与中は温罨法を行う。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ②       メイン【赤】生理食塩液100mL+アバスチン /div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)
- ③       メイン【白-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4.95mg /div30分
- ④       メイン【白-2】5%ブドウ糖液500mL+オキサリプラチン+デキサート4mg /div 2時間

\*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、S-1の投与量を変更すること

Ccr60～80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40～59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30以下は禁忌

### ※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.25m <sup>2</sup>	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m <sup>2</sup> ≤～<1.5m <sup>2</sup>	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m <sup>2</sup> ≤～	60mg/回	50mg/回	40mg/回