

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C19

申請日	2012/5/15	承認日	2012/7/9	委員長	印
レジメン登録	2012/5/15(見直し 2020/3/2)	仮承認日		承認者	印

S-1+放射線 療法	病名	大腸癌	外科	提出医	Dr
対象 cT3以深またはcN陽性の切除可能な大腸癌に対する術前放射線併用化学療法					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																																					
			1	5	8	10	12	15	20	22	25	26	29	30	33																									
放射線			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
S-1	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	
S-1	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○														○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: S-1:1日2回(朝夕食後)5日間投与・2日間休薬。
第1～5、8～12、22～26、29～33日目に経口投与
放射線:1. 8Gy/dayを5日間照射2日間休止とし、総線量45Gy/25frとする

【投与処方例(前投薬など)】

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、S-1の投与量を変更すること

Ccr60～80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40～59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30以下は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
$\sim < 1.25\text{m}^2$	40mg/回	30mg/回	25mg/回
$1.25\text{m}^2 \leq \sim < 1.5\text{m}^2$	50mg/回	40mg/回	30mg/回
$1.5\text{m}^2 \leq \sim$	60mg/回	50mg/回	40mg/回

参考文献 局所進行直腸癌に対するS-1を用いた術前化学放射線療法の忍容性試験

当院患者治療目的以外は
使用不可