

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C21

| | | | | |
|--------|-----------|------|-----|---|
| 申請日 | 2010/4/13 | 承認日 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録 | 2023/10/1 | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| | | | | |
|-----------|--------------|-----|----|-----|
| CapeOX | 病名 | 大腸癌 | 外科 | 提出医 |
| 対象 | 切除不能・進行再発大腸癌 | | | |

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | | | | | | | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | div | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | ※ | po(朝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カペシタビン | ※ | po(夕) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与処方例(前投薬など)】

- *手足症候群予防として、保湿剤を処方すること。
- *オキサリプラチン投与中は温罨法を行う。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】5%ブドウ糖液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4.95mg/div 30分
- ③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液500mL+オキサリプラチン+デキサート4mg/div 2時間

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、カペシタビンの投与量を変更すること

Ccr30~50mL/min 75%Dose

Ccr30以下は禁忌

※カペシタビンの内服量 2000mg/m²/Day

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

| 体表面積 | 1回用量※ | 1段階減量 | 2段階減量 |
|--|-------------|--------------|-------------|
| ~<1.36m ² | 1,200mg(4錠) | 900mg (3錠) | 600mg (2錠) |
| 1.36m ² ≦~<1.41m ² | 1,500mg(5錠) | | |
| 1.41m ² ≦~<1.51m ² | | 1,200mg (4錠) | |
| 1.51m ² ≦~<1.66m ² | | | 900mg (3錠) |
| 1.66m ² ≦~<1.81m ² | 1,800mg(6錠) | 1,500mg (5錠) | |
| 1.81m ² ≦~<1.96m ² | 2,100mg(7錠) | | 1200mg (4錠) |
| 1.96m ² ≦~<2.11m ² | | | |
| 2.11m ² ≦~ | | | |

本院患者治療目的以外は
使用不可