

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C31

| | | | | |
|--------|----------------------------|------|-----|---|
| 申請日 | 2017/3/15 | 承認日 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録 | 2017/3/15(見直し 2020/3/2) | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| | | | | | |
|------------------|----|-----|----|-----|----|
| Bevacizumab+TFTD | 病名 | 大腸癌 | 外科 | 提出医 | Dr |
|------------------|----|-----|----|-----|----|

対象 切除不能進行再発大腸癌の二次治療以降

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | | | | | | | |
| アバスチン(ベバシズマブ) | 7.5mg/kg | div | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| ロンサーフ | ※ | po(朝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| ロンサーフ | ※ | po(夕) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: 28日 = 1コース

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

アバスチン投与中は、タンパク尿(UPC比)・血圧測定を実施。

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL + アバスチン / div (初回90分、2回目60分、3回目以降30分で可)

ロンサーフ制吐剤セット処方

Day1~5、Day8~12 ナゼアOD(0.4mg) 1錠(分1 朝食後)
 Day1~5、Day8~12 デカロドン(0.5mg) 4錠(分1 朝食後)

*Day1.8のナゼアOD、デカドロンは夕食後。Day2.9以降は朝食後とする。

【ロンサーフの内服に関して】

ロンサーフの腎機能時における投与量はデータがなく不明

※ロンサーフの内服量は体表面積から算出すること

| 体表面積 | 1回用量※ |
|---|-------|
| $\sim < 1.07\text{m}^2$ | 35mg |
| $1.07\text{m}^2 \leq \sim < 1.23\text{m}^2$ | 40mg |
| $1.23\text{m}^2 \leq \sim < 1.38\text{m}^2$ | 45mg |
| $1.38\text{m}^2 \leq \sim < 1.53\text{m}^2$ | 50mg |
| $1.53\text{m}^2 \leq \sim < 1.69\text{m}^2$ | 55mg |
| $1.69\text{m}^2 \leq \sim < 1.84\text{m}^2$ | 60mg |
| $1.84\text{m}^2 \leq \sim < 1.99\text{m}^2$ | 65mg |
| $1.99\text{m}^2 \leq \sim < 2.15\text{m}^2$ | 70mg |
| $2.15\text{m}^2 \leq \sim$ | 75mg |

参考文献

KSCC1602試験