

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL + ポララミン5mg 2A + デキサート8mg div/0.5時間
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL div/0.5時間
- ④ メイン【赤-3】 生理食塩液500mL + アービタックス(400mg/m²) div/2時間
- ⑤ 終了後メインキープの生理食塩水の残りで点滴(注意！ ④と同じ速度で)

(2回目以降)Day8以降

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL + ポララミン5mg 1A + デキサート8mg div/0.5時間
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL div/0.5時間
- ④ メイン【赤-3】 生理食塩液250mL + アービタックス(250mg/m²) div/1時間(2回目以降)
- ⑤ 終了後メインキープの生理食塩水の残りで点滴(注意！ ④と同じ速度で)

【ビラフトビ・メクトビの減量に関して】

	ビラフトビ	メクトビ
減量レベル	300mg(1日1回)	45mg/回(1日2回)
1段階減量	225mg(1日1回)	30mg/回(1日2回)
2段階減量	150mg(1日1回)	15mg/回(1日2回)
3段階減量	投与中止	投与中止

参考文献 ビラフトビ・メクトビ 適正使用ガイド

Kopetz, et al M Engl J Med. 2019; 381(17): 1632-1643