中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C42

申請日	2022/3/21	承認日	2022/5/9	委員長	印
レジメン登録	2022/5/9	仮承認日		承認者	印

Capecitabine+放射線	病名	大腸癌	外　科	提出医	Dr
対象	直腸癌における補助化学療法				

薬剤商品名（一般名）	投与量（mg/m²等）	投与方法（div.iv.po等）	投与スケジュール（日） 1					5			8		10		12			15					20		22				25	26			29	30			33
放射線			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
カペシタビン	※	po(朝)	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
カペシタビン	※	po(夕)	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等：　カペシタビン：1日2回（朝夕食後）5日間投与　2日間休薬を5週間繰り返す
第1～5、8～12、15～19、22～26、29～33日目に経口投与
放射線：1．8Gy/dayを5日間照射2日間休止とし、総線量45Gy/25frとする

当院患者治療目的以外は使用不可

【投与処方例（前投薬など）】

＊手足症候群予防のために保湿剤の処方を行うこと

＊腎機能低下時、クレアチンクリアランスCcr30mL/min以下では禁忌

※カペシタビンの内服量（D法）

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・中止基準は臨床試験では明らかにされていない。

体表面積	1回用量※
～＜1.31㎡	900mg/回

1.31㎡≦～＜1.64㎡	1200mg/回
1.64㎡≦～	1500mg/回

参考文献 海外第Ⅲ相臨床試験(NSABP R-04試験)

当院患者治療目的以外は
使用不可