

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-G24

申請日	2019/7/18	承認日	2019/8/19	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	2019/7/26	承認者	印

S-1+DTX 療法	病名	胃癌	外科	提出医	Dr
対象	進行再発StgaeIVの胃癌で他の化学療法を施行した患者				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	10	15	20	22	25	30												
ドセタキセル	40mg/m ²	div	○																			
S-1	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】※ドセタキセル投与中は、手足をクーリングする

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 5%ブドウ糖液250mL+ドセタキセル /div 1時間

制吐剤セット処方⑦:むくみ抑え目的
Day2.3 デカドロン(0.5mg) 4錠(分1 朝食後)

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、S-1の投与量を変更すること
Ccr60~80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>

Ccr40～59mL/min 原則として1段階減量

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30未満は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.25m ²	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m ² ≦～<1.5m ²	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m ² ≦～	60mg/回	50mg/回	40mg/回

参考文献 J Cancer Res Clin Oncol (2014) 140:319-328