


中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-G03

申請日	2012/2/8	承認日	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	承認者	印

modified XP	病名	胃癌	外科	提出医	Dr
対象	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	10	15	20	22	25	30												
シスプラチン	60mg/m ²	div	○																			
カペシタビン	※	po(朝)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	※	po(夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 

【投与処方例(前投薬など)】治療前には、CVポートを留置すること

*手足症候群予防として、保湿剤を処方すること。

Day1~5は、体重測定を実施。開始時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

day1

- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL / 5分
- ④ メイン【赤-3】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑤ メイン【赤-4】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>

- ⑥ メイン【赤-5】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑦ メイン【白-1】ラクテック 500mL / div 3時間
- ⑧ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

day2.3

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ラクテック 500mL / div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

day4

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1~4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1~4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・カペシタビンの投与量を変更すること

シスプラチン	Ccr46~60mL/min 75%Dose
	Ccr30~45mL/min 50%Dose
	Ccr30未満は禁忌。
カペシタビン	Ccr30~50mL/min 75%Dose
	Ccr30未満は禁忌

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>

※カペシタビンの内服量 2000mg/m²/Day

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.36m ²	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36m ² ≦～<1.41m ²	1,500mg(5錠)		
1.41m ² ≦～<1.51m ²		1,200mg(4錠)	
1.51m ² ≦～<1.66m ²			
1.66m ² ≦～<1.81m ²	1,800mg(6錠)	900mg(3錠)	
1.81m ² ≦～<1.96m ²	2,100mg(7錠)		
1.96m ² ≦～<2.11m ²		1,500mg(5錠)	
2.11m ² ≦～	1200mg(4錠)		