

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-G30

申請日	2023/7/26	承認日	委員長	印
レジメン登録	2023/12/6	仮承認日	承認者	印

T-DXd(Trastuzumab Deruxtecan)	病名	胃癌	外科	提出医	Dr
対象	がん治療治療後に増悪したHER2陽性の切除治癒不能な進行・再発胃癌				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div. iv. po等)	投与スケジュール (日)																
			1	5	8	10	15	20	22	25	...	35							
エンハーツ(トラスツズマブ デルクステカン)	6.4mg/kg	div	○																
投与間隔・休薬期間等：21日＝1コース																			

【投与処方例 (前投薬など)】

- ※間質性肺疾患対応フローチャートに沿って、ILD疑い時より対応をすること。
- ※開始前にはCT、レントゲン、血液検査(KL-6を含む)、心エコー、心電図を施行すること。
- ※エンハーツ調製時と調製済みのボトルは遮光し、投与を行う。
- ※エンハーツは調製後4時間以内に投与を終了すること。
- ※インラインフィルターを使用する。

- ① メインキープ【緑】 5%ブドウ糖液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 5%ブドウ糖液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート9.9mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 5%ブドウ糖液100mL+注射用水+エンハーツ /div 初回90分、2回目以降30分
エンハーツ1Vを注射用水5mLで溶解し、使用。
終了後、メインの5%ブドウ糖液を流してフラッシュをすること。

【副作用による減量基準】

通常投与量：6.4mg/kg

1段階減量：5.4mg/kg

2段階減量：4.4mg/kg

3段階減量(中止)：4.4mg/kgで忍容性が得られない場合には投与を中止する

制吐剤セット処方①

□DMがない場合

Day1～4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

Day2～4 デカドロン4錠 2錠(分1 朝食後)

□DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

Day2～4 デカドロン4錠 2錠(分1 朝食後)