

- ② メイン【赤】 生理食塩液100mL＋キイトルーダ /div 30分
- ② メイン【白】 生理食塩液250mL＋注射用水＋トラスツズマブ /div 初回90分、2回目以降30分
 注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解
 ※トラスツズマブの減量は許容されない

【腎機能低下時の減量方法】

※カペシタビン クレアチンクリアランスに応じて、カペシタビンの投与量を変更すること
 Ccr30～50mL/min : 75%Dose
 Ccr<30mL/min : 禁忌

【副作用による減量基準】

※カペシタビンの内服量 2000mg/m²/Day C法
 FN≧G3、血小板減少≧G2(7.5万に回復後1段階減量)、下痢・粘膜炎・FHS≧G2の場合、1段階減量

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.36m ²	1200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36m ² ≦～<1.41m ²	1500mg(5錠)		
1.41m ² ≦～<1.51m ²		1200mg(4錠)	
1.51m ² ≦～<1.66m ²			900mg(3錠)
1.66m ² ≦～<1.81m ²	1800mg(6錠)	1500mg(5錠)	
1.81m ² ≦～<1.96m ²	2100mg(7錠)		
1.96m ² ≦～<2.11m ²		1200mg(4錠)	
2.11m ² ≦～			

参考文献：KEYNOTE-811試験