



- ② メイン【白】 生理食塩液250mL+注射用水+トラスツズマブ /div 初回90分、2回目以降30分  
 注射用水は150mg:7.2mL、60mg:3mLで溶解  
 ※トラスツズマブの減量は許容されない

### 【腎機能低下時の減量方法】

#### ※エスワン

Ccr60~80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量  
 Ccr40~59mL/min 原則として1段階減量  
 Ccr30~39mL/min 原則として2段階減量  
 Ccr<30mL/min : 禁忌

### 【副作用による減量基準】

#### ※S-1の内服量 C法

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
~<1.25m <sup>2</sup>	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m <sup>2</sup> ≤~<1.5m <sup>2</sup>	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m <sup>2</sup> ≤~	60mg/回	50mg/回	40mg/回

以下に1日用量を記載する

開始投与量(<1.25m<sup>2</sup>) 80mg/日→1段階減量 60mg/日→2段階減量 50mg/日

開始投与量(1.25≤~<1.5m<sup>2</sup>) 100mg/日→1段階減量 80mg/日→2段階減量 60mg/日

開始投与量(1.5m<sup>2</sup>≤) 120mg/日→1段階減量 100mg/日→2段階減量 80mg/日

S-1の投与量が60mg/日の場合、朝40mg、夕20mgに分割して投与を行う

参考文献：KEYNOTE-811試験

SOX+Traの KSCC/HGCSG/CCOG/PerSeUS 1501B試験でのTra+SOXのS-1の投与量を参考