



Ccr30~50mL/min : 75%Dose

Ccr<30mL/min : 禁忌

### 【副作用による減量基準】

※カペシタビンの内服量 2000mg/m<sup>2</sup>/Day C法

好中球減少 $\geq$ G4、FN=G3、血小板減少 $\geq$ G3 (7.5万以上に回復後)

下痢・粘膜炎・FHS=G2.3 (G1以下に回復後) の場合、1段階減量

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
~<1.36m <sup>2</sup>	1200mg (4錠)	900mg (3錠)	600mg (2錠)
1.36m <sup>2</sup> ≤ ~<1.41m <sup>2</sup>	1500mg (5錠)		
1.41m <sup>2</sup> ≤ ~<1.51m <sup>2</sup>			
1.51m <sup>2</sup> ≤ ~<1.66m <sup>2</sup>			
1.66m <sup>2</sup> ≤ ~<1.81m <sup>2</sup>	1800mg (6錠)	1200mg (4錠)	900mg (3錠)
1.81m <sup>2</sup> ≤ ~<1.96m <sup>2</sup>			
1.96m <sup>2</sup> ≤ ~<2.11m <sup>2</sup>	2100mg (7錠)	1500mg (5錠)	900mg (3錠)
2.11m <sup>2</sup> ≤ ~			

参考文献：KEYNOTE-859試験