

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-G09

申請日	2008/8/28	承認日	委員長	印
レジメン登録日	2023/10/1	仮承認日	承認者	印

S-1+CDDP 療法	病名	胃癌	外科	提出医	Dr
対象	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌 一次治療以降				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方 法(div.iv.po 等)	投与スケジュール(日)																	
			1	5	8	10	15	20	22	25	...	35								
シスプラチン	60mg/m ²	div						○												
S-1	※	po(朝・夕)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

投与間隔・休薬期間等: 35日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】治療前には、CVポート・カテーテルを留置すること
 Day1〜5は、体重測定を実施。開始時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。
 腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

day8

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg / div 30分
- ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL / 5分
- ⑤ メイン【赤-4】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑥ メイン【赤-5】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑦ メイン【赤-6】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑧ メイン【白-1】ラクテック 500mL / div 3時間

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>

- ⑨ 【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分
⑩ メイン【白-2】 ラクテック 500mL / div 3時間

day9.10

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
② ラクテック 500mL / div 3時間
③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

day11

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
② ヴィーンD 500mL /div 2時間

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day8~11 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day8~11 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・S-1の投与量を変更すること
シスプラチン

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr30~45mL/min 50%Dose

Ccr30未満は禁忌。

S-1

Ccr60~80mL/min 初回量より必要に応じて1段階減量

Ccr40~59mL/min 原則として1段階減量

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>

Ccr30～39mL/min 原則として2段階減量

Ccr30未満は禁忌

※S-1の内服量

血液毒性・非血液毒性発現時の休薬・減量・再開基準を参考にする。

体表面積	1回用量※	1段階減量	2段階減量
～<1.25m ²	40mg/回	30mg/回	25mg/回
1.25m ² ≤～<1.5m ²	50mg/回	40mg/回	30mg/回
1.5m ² ≤～	60mg/回	50mg/回	40mg/回

参考文献：SPIRITS試験；Lancet Oncol. 2008 Mar; 9 (3) : 215-21.