

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-19

|                     |      |     |   |
|---------------------|------|-----|---|
| 申請日                 | 承認日  | 委員長 | 印 |
| レジメン登録<br>2023/10/1 | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

|                               |    |        |       |     |    |
|-------------------------------|----|--------|-------|-----|----|
| GEM+CDDP                      | 病名 | 非小細胞肺癌 | 呼吸器外科 | 医師名 | Dr |
| <b>対象</b> 未治療・既治療・術後再発の非小細胞肺癌 |    |        |       |     |    |

| 薬剤商品名<br>(一般名) | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等) | 投与方法<br>(div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
|                |                              |                      | 1           | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| シスプラチン         | 80mg/m <sup>2</sup>          | div                  | ○           |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| ゲムシタビン         | 1000mg/m <sup>2</sup>        | div                  | ○           |   | ○ |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース  
6コースまで

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

※腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

シスプラチン

Ccr46～60mL/min 75%Dose

Ccr31～45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

ゲムシタビン

Ccr60以下では、代謝物のクリアランスが低下するため慎重投与

Day1～5は、体重測定を実施。入院時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。  
腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1**
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
  - ② メイン【赤-1】生理食塩液250mL /div 1時間
  - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg /div 30分
  - ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL / 5分
  - ⑤ メイン【赤-4】5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン /div 30分
  - ⑥ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
  - ⑦ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
  - ⑧ メイン【白-3】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
  - ⑨ メイン【黄-1】ラクテック 500mL / div 3時間
  - ⑩ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
  - ⑪ メイン【黄-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day2.3**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
  - ② ラクテック 500mL / div 3時間
  - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
  - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
  - ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

- day4**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
  - ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

- day8 ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div  
② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分  
③ メイン【赤-2】5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン /div 30分

### 制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1～4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

当院患者治療目的以外は  
使用不可