

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-44

| | | | | | |
|--------|----------|------|-----------|-----|---|
| 申請日 | 2021/1/6 | 承認日 | 2021/1/18 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録 | 2021/2/1 | 仮承認日 | | 承認者 | 印 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------|-------|-----|----|
| Nivolumab+PEM(ニボルマブ) | 病名 | 非小細胞肺癌 | 呼吸器外科 | 医師名 | Dr |
| 対象 | 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(腺癌)に対する一次治療 ただしNivolumab+PEMを含むレジメンからの維持療法 | | | | |

| 薬剤商品名 (一般名) | 投与量 (mg/m ² 等) | 投与方法 (div.iv.po等) | 投与スケジュール(日) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------------------|-------------|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | -5 | 1 | 10 | 21 | | | | | | | | | | |
| オプジーボ(ニボルマブ) | 360mg/Body | div | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| アリムタ(ペムトレキセド) | 500mg/m ² | div | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| パンビタン末 | 1g/day | 経口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メチコバル | 1mg(9週毎) | 筋注 | ○ | | | | | | | | | | | | | |

投与間隔・休薬期間等: **21日=1コース**
 ニボルマブは【T-43】初回から数えて最長24ヶ月まで 1コース

【投与処方例(前投薬など)】インラインフィルターを使用する

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+オプジーボ /div 30分
- ④ メイン【白】生理食塩液100mL+アリムタ /div 10分

アリムタ投与の1週間以上前～アリムタ最終投与の22日目まで

パンビタン末 0.5mg/日

メチコバルル 1mg 筋注(9週間ごと)

当院患者治療目的以外は
使用不可