



※デュルバルマブとトレリムマブはインラインフィルターを使用。

※腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、ペメトレキシドの投与量を変更すること

Ccr46～60mL/min 正常人と同じ

Ccr45mL/min以下は投与しないこと

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+イジユド /div 1時間(最終濃度を0.1～10mg/mLとする)
- ③ メイン【白】生理食塩液100mL+イミフィンジ /div 1時間
- ④ メイン【黄-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート3.3mg /div 30分
- ⑤ メイン【黄-2】生理食塩液100mL+ペメトレキシド /div 10分
- ⑥ メイン【青】生理食塩液250mL+カルボプラチン /div 1.5時間

#### 制吐剤セット処方④

Day2.3 デカドロン4mg 1錠(分1 朝食後)

ペメトレキシド投与の1週間以上前～ペメトレキシド最終投与の22日目まで

パンビタン末 0.5mg/日

メチコバルル 1mg 筋注(9週間ごと)

参考文献：イミフィンジ、イジユド適正使用ガイド

POSEIDON試験