

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-20

申請日	2019/12/26	承認日	2020/1/20	委員長	印
レジメン登録	2020/1/9	仮承認日	2019/12/28	承認者	印

M-VAC(術前) 療法	病名	尿路上皮癌	泌尿器 科	提出医	Dr
対象	浸潤性尿路上皮癌の術前化学療法				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)													
			1	5	8	10	15	20	22	25	30					
メソトレキサート (メソトレキサート)	30mg/m ²	div	○							○		○				
エクザール(ビンブラスチン)	3mg/m ²	div	○							○		○				
アドリアマイシン	30mg/m ²	div	○													
シスプラチン	70mg/m ²	div	○													

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース
2コースまで

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

シスプラチン

Ccr47~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。

メソトレキサート

Ccr16~60mL/min 50%Dose

Ccr15以下は禁忌

Day1～5は、体重測定を実施。1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。
腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】 ヴィーンD 500mL+メイロン静注7%(20mL) 2A / div 3時間
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+メソトレキサート /div 30分
 - ④ メイン【白-1】ラクテック500mL / div 3時間
 - ⑤ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day2**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロキシ1V+デキサート12mg / div 30分
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL+エクザール /div 5分
 - ④ メイン【白-1】生理食塩液50mL+アドリアマイシン /div 5分
 - ⑤ メイン【黄-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑥ メイン【黄-2】20%マンニトール注射液 300mL /div 全開(15分)
 - ⑦ メイン【黄-3】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
 - ⑧ メイン【青-1】ラクテック 500mL / div 3時間
 - ⑨ 【コネクタ1】 プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑩ メイン【青-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day3.4**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ラクテック 500mL / div 3時間
 - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
 - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

- day5**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ヴィーンD 500mL /div 2時間

- day15.22① メインルート【緑】 生理食塩液250mL / div
② メイン【赤-1】 ヴィーンD 500mL+メイロン静注7%(20mL) 2A / div 3時間
③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL+メソトレキサート /div 30分
④ メイン【白-1】 生理食塩液50mL+エクザール /div 5分

制吐剤セット処方②⑥

Day2	アプレピタント(125) 1C(抗がん剤の1時間前)
Day3、4	アプレピタント(80) 1Cap(分1 朝食後)
Day2~5	コントミン糖衣錠(12.5mg) 2錠(分2 朝・夕食後)

当院患者治療目的以外は
使用不可