

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-08

申請日	承認日 2014/7/11	委員長	印
レジメン登録 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

TGP 療法	病名 尿路上皮癌	泌尿器 科	提出医 Dr
対象	切除不能・進行の転移性尿路上皮癌 二次治療		

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	8	10	15	20	25	30							
パクリタキセル	80mg/m ²	div	○				○										
ゲムシタビン	1000mg/m ²	div	○				○										
シスプラチン	50mg/m ²	div	○														

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

シスプラチン

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr<30は禁忌。

ゲムシタビン

Ccr60以下では、代謝物のクリアランスが低下するため慎重投与

Day1~5は、体重測定を実施。入院時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1**
- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】生理食塩液50mL+デキサート8mg /div 5分
 - ③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
 - ④ メイン【赤-2】生理食塩液100mL /div 30分
 - ⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液250mL+パクリタキセル /div 1時間
 - ⑥ メイン【白】5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン /div 30分
 - ⑦ メイン【黄-1】ラクテック 500mL / div 3時間
 - ⑧ メイン【黄-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day2**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】生理食塩水100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg / div 30分
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液50mL /div 5分
 - ④ メイン【赤-3】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑤ メイン【赤-4】20%マンニトール注射液 300mL /div 全開(15分)
 - ⑥ メイン【赤-5】生理食塩水500mL+シスプラチン / div 2時間
 - ⑦ メイン【白-1】ラクテック500mL / div 3時間
 - ⑧ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
 - ⑨ メイン【白-2】ラクテック 500mL / div 3時間

- day3.4**
- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
 - ② ラクテック 500mL / div 3時間
 - ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
 - ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分

⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

day5 ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分

② ヴィーンD 500mL /div 2時間

day8 ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div

② メイン【赤-1】生理食塩水50mL+デキサート8mg /div 5分

③ 【コネクタ1】ファモチジン注20mg 1A /iv 5分

④ メイン【赤-2】生理食塩水100mL /div 30分

⑤ メイン【赤-3】5%ブドウ糖液250mL+パクリタキセル /div 1時間

⑥ メイン【白】5%ブドウ糖液100mL+ゲムシタビン /div 30分

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的

Day1、8 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(抗がん剤の30分前)

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day2~5 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day2~5 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可